

# Empecid<sup>®</sup>

Gyno

Tratamiento de  
**6** DÍAS

## Crema vaginal Clotrimazol 1%



Crema Vaginal - Antimicótico

Venta Libre  
Industria Alemana  
35 g

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO

### ¿Qué contiene EMPECID<sup>®</sup> GYNO?

Cada 100 gramos de crema vaginal contiene; ingredientes activos: clotrimazol 1,0 gramos, ingredientes inactivos: estearato de sorbitano, polisorbato, esperma de ballena sintético, alcohol cetilestearílico, 2-octildodecanol, alcohol bencílico, agua desmineralizada.

### Acción

Antimicótico.

### ¿Para qué se usa EMPECID<sup>®</sup> GYNO?

EMPECID<sup>®</sup> GYNO se usa para el tratamiento de infecciones en la región genital causada por hongos.

### ¿Qué personas no pueden utilizar EMPECID<sup>®</sup> GYNO?

No use este medicamento si usted sabe que es alérgico al clotrimazol o a algún otro de sus ingredientes.

### ¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar EMPECID<sup>®</sup> GYNO?

Evite el contacto con los ojos, no ingerir.

Si usted tiene fiebre (temperatura de 38°C o más), dolor en la parte baja del abdomen; dolor de espalda, flujo vaginal con mal olor, náuseas, hemorragia vaginal, y/o dolor que se irradia al hombro consulte a su médico antes de tomarlo.

No debe iniciar el tratamiento durante la menstruación, o bien, procurar terminarlo antes de la misma.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de utilizar este producto.

### ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy utilizando EMPECID<sup>®</sup> GYNO?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por EMPECID<sup>®</sup> GYNO como reacciones alérgicas, picazón, prurito, rash, descamación, edema, eritema (enrojecimiento), malestar, irritación, hemorragia vaginal, dolor pélvico y dolor abdominal.

Este medicamento puede causar irritación de la piel porque contiene alcohol cetilestearílico.

EMPECID<sup>®</sup> GYNO no debe utilizarse al mismo tiempo con tampones, duchas vaginales, espermicidas, productos de látex como preservativos y diafragmas.

Se recomienda no tener relaciones sexuales durante el uso de esta medicación ya que la infección puede ser transferida a su pareja, y la seguridad y eficacia de los productos de látex utilizados como contraceptivos se encuentra disminuida.

Debe consultar al médico si los síntomas empeoran durante el tratamiento, o se mantienen después de 3 días de terminado el mismo, si observa aumento del flujo vaginal o cambios en su aspecto u olor, o si presenta sangrado vaginal.

### ¿Cómo se usa EMPECID<sup>®</sup> GYNO?

Adultos y mayores de 16 años: después de lavarse las manos, introducir cuidadosamente tan profundamente como sea posible dentro de la vagina EMPECID<sup>®</sup> GYNO, por la noche.

La aplicación se realiza con mayor facilidad en posición acostada y con las piernas ligeramente flexionadas.

Deberá realizarse la aplicación sobre las áreas afectadas (desde los órganos genitales externos hasta el ano en la mujer), aplicar la crema en capa fina 2 a 3 veces al día. El periodo normal de tratamiento es de 1 a 2 semanas.



Si los síntomas persisten por más de 7 días usted debe consultar al médico.

Las infecciones recurrentes pueden indicar una causa médica subyacente. Usted debe consultar a su médico si los síntomas vuelven dentro de los 2 meses.

**¿Qué debo hacer ante una sobredosis, si usé más cantidad de la necesaria, o si ingerí el producto?**

Ante la eventualidad de una ingestión accidental, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez – Tel.(011) 4962-6666/2247

Hospital Dr. Alejandro Posadas – Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel.: (0221) 451-5555

**¿Tiene usted alguna pregunta?**

Llame sin cargo al 0800 888 8020 de lunes a viernes de 9 a 16 h, o al servicio ANMAT responde 0800 333 1234

**Conservación:**

No almacenar a temperaturas superiores a 25°C.

**ESTE MEDICAMENTO, COMO CUALQUIER OTRO, DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

® Marca registrada de Bayer AG, Alemania.

Bajo licencia de Bayer AG, Alemania.

Fabricado en GP Grenzach Produktions GmbH, Emil-Barell-Str. 7, D-79639 Grenzach- Wyhlen, Alemania.

Importado y distribuido por:

Bayer S.A. Ricardo Gutiérrez 3652 (B1605EHD) Munro, Prov. de Buenos Aires, Argentina.

Dir. Téc.: José Luis Role, Farmacéutico.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Cert. Nro. 34470

Edición: Empecid Gyno Dispo 0753/12 CCDS 04

Rev. 12/05/15

**Presentación.**

**EMPECID® GYNO** envase con 35,0 gramos de crema vaginal y 6 aplicadores descartables



Bayer

84752592

